

AIDS

É a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, uma infecção causada pelo vírus HIV, que invade o organismo e bloqueia o funcionamento do sistema imunológico natural (de defesa do corpo humano).

9.

Quem está contaminado e desenvolveu a AIDS está vulnerável a qualquer outro tipo de doença, por mais simples que seja, como uma gripe, por exemplo. O HIV pode ser contraído por via sexual, sanguínea ou perinatal, e nunca por beijo, aperto de mão, alimentos, ar ou picadas de inseto.

PAPILOMAVÍRUS

O agente infeccioso, responsável por quase todos os tumores de colo de útero, ataca, sobretudo, mulheres jovens. O HPV atinge cerca de 12 milhões de brasileiras em idade reprodutiva, mas só provoca lesões graves numa pequena porção delas. Na maioria dos casos, permanece latente ou evidencia sintomas facilmente tratáveis.

10.

Como a maioria das mulheres não faz o Teste de Papanicolaou periodicamente, costuma-se descobrir a doença apenas em fase avançada.



IAS - 34577

Versão 4.0 - julho/2024

PRECISA DE AJUDA?



Fale com a nossa central 24h:

0800 940 6900
(34) 3239-6910



@UnimedUberlândia

www.unimeduberlandia.coop.br



INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

Informações e prevenção

Unimed
Uberlândia

...

São infecções transmitidas principalmente pelo contato sexual. Sua disseminação se dá pelo ato sexual: oral, vaginal ou anal.

Não se adquire IST em:

1. Piscinas.
2. Vaso Sanitário.
3. Banho.
4. Assentos.
5. Maçanetas.
6. Talheres e Copos.

Sintomas mais comuns:

1. Secreção vaginal persistente, com ou sem ardência.
2. Dor no baixo ventre ou na relação sexual.
3. Feridas, verrugas ou pequenas bolhas na região genital.
4. Ínguas no pescoço, axilas ou virilhas.

Não esconda uma IST por vergonha ou medo, sempre avise seu parceiro e evite relações sexuais até terminar o tratamento.



DOENÇAS MAIS CONHECIDAS

CONDILOMA ACUMINADO

1. Conhecido como “Crista de Galo”, forma verrugas que crescem e se espalham nos órgãos genitais masculinos e femininos.

GONORREIA

2. No homem, há corrimento amarelado pelo canal da urina, acompanhado ou não de ardor ao urinar. Na mulher, os sintomas podem ser os mesmos, porém, quase sempre não são percebidos. Na maioria das vezes, ela só saberá quando avisada pelo parceiro ou por meio do exame ginecológico.

HERPES GENITAL

3. Ardência e coceira na região genital, que evolui para pequenas bolhas que se rompem, formando feridas. O vírus não é transmitido após cicatrização, mas permanece no corpo, podendo haver novo aparecimento.

LINFOGRANULOMA VENÉREO

4. Manifesta-se com o aparecimento de tumoração na virilha (íngua), extremamente dolorosa.

SÍFILIS

5. Ferida indolor na região genital, que cicatriza espontaneamente. Pode causar alterações em outras parte do corpo e prejudica, inclusive, a gestação. Pode ser diagnosticada por meio do exame de sangue no período em que não há sintomas.

URETRITE

6. Dificuldade e ardor ao urinar. Presença de secreção constante, mais frequente pela manhã.

CANDIDÍASE

7. Aparecimento de corrimento branco grumoso, acompanhado de coceira e ardência ao urinar.

TRICOMONÍASE

8. Secreção amarelo-esverdeada de odor extremamente fétido e ardência vaginal.